

크라렉신정

V.190321

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부 문서를 주의 깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 클로르록사존(KP) 150mg, 에텐자미드(KP) 150mg, 카페인무수물(KP) 25mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(KP) 소/우유
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 백색의 원형 정제

【효능·효과】 어깨결림, 요(허리)통, 신경통

【용법·용량】 성인 1회 1~2정, 1일 2회, 동통(동증) 또는 발작시에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사에게 상담하십시오.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 담마진(두드러기), 피부병, 기관지 천식, 알레르기 성비염, 식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가진 사람
- 2) 지금까지 약으로 인한 알레르기증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 소양증(가려움증) 등)이 일어났던 사람
- 3) 신장(콩팥)병, 간장병이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신 가능성이 있는 부인
- 5) 고령자(노인), 몸이 약한 사람 및 허약 체질자
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받는 사람

3. 복용시 다음의 상황에 주의하십시오.

- 1) 본제는 과민에 해당하는 성분을 함유하므로 정해진 용법·용량을 엄수하십시오.
- 2) 다음의 약제와 동시 복용을 하지 마십시오.
해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 음주시에는 복용하지 마십시오.
- 4) 본제는 15세 미만의 소아 및 유아에게는 복용시키지 마십시오.

4. 복용중 또는 복용후에는 다음에 주의하십시오.

- 1) 본제의 복용으로 인해 발열, 발적(충혈되어 붉어짐), 오심(구역), 구토, 식욕 부진, 위부불쾌감, 현훈(어지러움) 등의 증상이 나타날 때에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
- 2) 본제의 복용으로 인해 현훈(어지러움), 휘청거림, 졸음을 일으킬 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지마십시오.
- 3) 2주간 정도, 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 일시 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
- 4) 장기 연용(계속복용)하지 마십시오.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 습기가 적은 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 보전하기 위해 타 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 외부 포장 참조

【포장단위】 10정(10정/PTP X 1), 1000정/병

- ◆ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- ◆ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘파마(주) 홈페이지(<http://www.gjpharma.co.kr>)나 개발학술팀(☎080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

첨부 문서 작성일자 : 2019년 03월 21일