

# 지엘타이밍 정 (카페인무수물)

분류번호:115  
일반의약품

V.200409

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

## [원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 카페인무수물(KP) ..... 50mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소/우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 리보플라빈, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 전호화전분, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 페퍼민트분말향 71329

## [성상] 노란색의 팔각형 정제

## [효능 · 효과] 졸음

## [용법 · 용량] 성인 : 카페인무수물로서 1회 100~300mg을 1일

1~3회 경구 투여한다(복용한다).

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 위궤양 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 심질환 환자
- 3) 녹내장 환자

### 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 과량투여에 의해 진전(떨림), 어지러움, 심계항진(두근거림), 불면, 불안, 동공산대, 부정맥, 기외수축(조기수축), 빈맥(빠른맥), 이명(귀울림) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 기타: 만성 녹내장을 악화시킬 수 있다.

### 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 중주신경계의 심한 흥분상태는 치오펜탈나트륨과 같은 단시간형 바르비탈계 약물을 투여함으로써 조절될 수 있다.
- 2) 이 약은 태반을 통과하고 모유중으로 쉽게 이행되므로 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 장기 연용(계속 사용)하지 않는다.
- 3) 일반적으로 고령자(노인)에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량을 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다.

## 5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

### [저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

### [사용기한]

외부포장 참조

### [포장단위]

12정(12정/PTPx1)

- 
- ◆ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
  - ◆ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
  - ◆ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
  - ◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘파마(주) 홈페이지(<https://www.glypharma.co.kr>)나 개발학술팀(☎080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.
  - ◆ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
  - ◆ 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부 문서 작성일자: 2020년 04월 09일

---