

그루타제정

*** 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부 문서를 주의 깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.**

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 :

판크레아틴(KP)	175mg
(전분당화력 92단위 이상, 지방소화력 52단위 이상, 단백소화력 3380단위 이상) 돼지/돼징 우담즙건조엑스(생규)	25mg
(황산으로서 11.25mg) 소/담즙	
디메티론(NF)	25mg
셀룰라제(KP)	50mg
(섬유소당화력 5단위 이상)	

■ 첨가제(타르색소) : 황색4호, 청색4호, 청색2호

■ 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탈실드녹색(39G570), 포비돈

[성상] 연녹색의 정방형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화축진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정 1회 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3) 이 약은 황색4호(타르타르진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항

1) 청해진 용법·용량을 잘 지킬 것

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것

3) 오염물질 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

◆ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.

◆ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

◆ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템

(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 자엘파마(주) 홈페이지(<https://www.glpharma.co.kr>)나 개발학술팀(☎080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.

◆ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

◆ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223), 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)

작성일자 : 2021년 03월 05일

● 제조의뢰자 : 자엘파마(주) 경기도 안양시 만안구 시민대로 35

● 제조자 : (주)비스칸바이오팜 경기도 안성시 원곡면 원당로 354