



스에르 정 (독시라민속신산염)

V.190308

※ 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분 : 독시라민속신산염(USP) 25mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(KP) 소/우유
- 첨가제(타르색소) : 청색1호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

축적, 변비 등의 이상 반응이 증가할 수 있으므로 주의한다.

[성상] 연한 청색의 타원형 정제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 의사 또는 약사와 상의 없이 다른 약물과 병용(함께 복용)하거나 2주 이상 투여하지 않는다.
- 2) 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않는다.

[효능·효과]

불면증의 보조치료 및 진정

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 사람

[용법·용량]

성인 : 독시라민속신산염 1정 1회 25mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다(먹는다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
- 2) 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여한다.
- 3) 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 폐기종, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 전립선 비대 환자
- 4) 수유부
- 5) 15세 이하의 소아
- 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정(10정/PTPx1)

[사용기한] 외부 포장 참조

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용)시 소변

- ◆ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- ◆ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ◆ 최신의 정보로 변경된 내용은 지엘파마(주) 홈페이지(<http://www.glypharma.co.kr>)나 개발학술팀(☎080-850-3922)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 본 의약품은 엄격한 품질관리(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

첨부 문서 작성일자 : 2019년 03월 08일